

Tabulka č. 11

**LÍHNUTÍ DRŮBEŽE V ČESKÉ REPUBLICE od počátku roku 2004**

tis. ks

| Počet násadových vajec<br>vložených do lůhni | Slepice, kohouti |               |             | Kachny | Husy | Krůty | Perličky |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------|------|-------|----------|
|                                              | nosná plemena    | masná plemena | kombinovaná |        |      |       |          |
| prarodičovská generace                       | 23               | -             | -           | -      | -    | -     | -        |
| rodičovská generace                          | 326              | 5 252         | -           | -      | -    | -     | -        |
| užitková (finální hybridi)                   | 24 300           | 243 373       | -           | 5 627  | 606  | 2 388 | -        |
| <b>Počet vylihnutých mláďat</b>              |                  |               |             |        |      |       |          |
| prarodičovská generace                       | 7                | -             | -           | -      | -    | -     | -        |
| rodičovská generace                          | 195              | 3 587         | -           | -      | -    | -     | -        |
| užitkové kuřičky nosného typu                | 7 683            | -             | -           | -      | -    | -     | -        |
| mláďata na výkrm                             | -                | 189 911       | -           | 4 285  | 350  | 1 680 | -        |
| kohouti k chovu                              | -                | -             | -           | -      | -    | -     | -        |