

8. Zadušení (kódy W75-W84)

Zadušení patří mezi skupiny příčin úmrtí s velkou frekvencí výskytu. Jedná se o náhodná zadušení, oběšení či uškrcení, vdechnutí potravy, žaludečního obsahu nebo jiných předmětů, ohrožení dýchání po zavalení a jiná ohrožení dýchání (W75-W84).

I když počty zemřelých zadušením v jednotlivých letech kolísají oběma směry a údaj v roce 2006 je menší než ve výchozím roce 1994, má celá časová řada trend vzestupný. Muži se podílejí na celkovém počtu úmrtí za sledované období dvěma třetinami.


Tab. 8.1. Zemřelí zadušením

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Celkem	302	250	253	286	279	262	304	291	249	330	307	299	266
v tom: muži	194	184	173	192	190	182	209	208	165	220	204	189	175
ženy	108	66	80	94	89	80	95	83	84	110	103	110	91
Podíl mužů (v %)	64,2	73,6	68,4	67,1	68,1	69,5	68,8	71,5	66,3	66,7	66,4	63,2	65,8
Nezjištěný úmysl	9	20	22	14	21	17	12	13	8	14	13	25	23

Vzhledem k velkým změnám v obsahové náplni obdobné skupiny v dřívějších revizích není možné srovnání za celé období od roku 1919. Při srovnání s předešlou revizí je roční průměr zemřelých sice nižší (cca o 5%), ovšem např. údaj z roku 2003 je na úrovni velmi vysokých hodnot, které byly na konci 70. let a v první polovině 80. let.

**Graf 8.1. Zemřelí zadušením podle věku na 100 tis. obyvatel
průměrné roční údaje za roky 1994 – 2006**

Od jiných skupin příčin úmrtí se tato výrazně odlišuje rozložením četnosti výskytu podle věku. Jedná se o velký počet úmrtí dětí ve věku do 1 roku. I když úhrnný počet za celé období je ovlivněn hlavně počátečními roky a zejména rokem 1994. Údaj roku 1994 (54 zemřelých) je vysoký při srovnání s roky následujícími (počty úmrtí byly v rozmezí 8-22). Při srovnání s analogickými kódy v letech 1992 a 1993 je počet úmrtí roku 1994 úměrný. Proč po roce 1994 došlo k výraznému poklesu těchto úmrtí, zda se jednalo např. o změnu praxe v kódování, se ani na ÚZIS již zjistit nepodařilo. I po roce 1994 je však intenzita úmrtnosti proti dalším věkovým skupinám výrazně zvýšená. V relativním vyjádření k počtu osob je za celé období u dětí do 1 roku úmrtnost větší než u všech dalších věkových skupin. Při samostatném posouzení období od roku 2000 to sice již není hodnota zcela největší, ale stále patří k nejvyšším (jen skupiny nad 85 roků ji mají větší).



Úmrtí dětí do 1 roku jsou ve větší míře soustředěny do věku 6 měsíců a jedná se hlavně o vdechnutí žaludečního obsahu (kód W78).

Tab. 8.2. Zemřelí zadušením ve věku do 1 roku podle věku v měsících v úhrnu za roky 1994 – 2006

	Věk (v měsících)											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Počet	20	33	43	27	37	22	26	16	17	20	15	15
Podíl (v %)	6,9	11,3	14,8	9,3	12,7	7,6	8,9	5,5	5,8	6,9	5,2	5,2
Úhrnný podíl (v %) v uvedeném věku	6,9	18,2	33,0	42,3	55,0	62,5	71,5	77,0	82,8	89,7	94,8	100,0

Oproti jiným skupinám příčin se u této skupiny neprojevuje evidentní sezónnost. Rozdělení úmrtí do jednotlivých měsíců má od průměru odchylky jen nevelké.

Z celkového počtu úmrtí zadušením připadají tři čtvrtiny na zadušení vdechnutím žaludečního obsahu. Zhruba 10 % připadá na úmrtí po vdechnutí potravy a 5 % na zadušení po zasypání hmotami. Ani další dílčí položky v součtu za roky 1994 – 2006 nejsou ojedinělé, vykytují se v řádu desítek.