

## Modelové příklady výpočtů jednotlivých druhů indexů

### 1. Příklad výpočtu průměrných cen jednotlivých sortimentů surového dříví

#### 1.1 Výpočet průměrných cen – vlastníci:

Sortiment dřeva		Respondent	1.čtvrtletí		
			Cena vykázaná	Váha respondenta	Průměrná cena
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Výřezy III.A/B třídy jakosti	smrk	1	1812	1,37	2343
		2	1735	1,37	
		3	2633	5,64	
		4	2600	4,70	
		⋮	⋮	⋮	
	r	2458	1,37		
	borovice	1	1317	x	1276
		2	1261	x	
		3	1280	x	
		⋮	⋮	⋮	
r		1251	x		
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

vážený aritmetický průměr

prostý aritmetický průměr

#### a) Výpočet průměrné ceny váženým aritmetickým průměrem:

$$C_{vap} = \frac{\sum(C_i * V_i)}{\sum V_i} = \frac{1812 * 1,37 + 1735 * 1,37 + 2633 * 5,64 + 2600 * 4,70 \dots + 2458 * 1,37}{m * 1,37 + (5,64 + 4,70 + \dots)} = 2343$$

$$\sum V_i = \sum V_0 + \sum V_v = m * 1,37 + (5,64 + 4,70 + \dots) = 100$$

$C_{vap}$  ..... průměrná cena vypočtená váženým aritmetickým průměrem

$C_i$  ..... cena vykázaná i-tým respondentem

$v_i$  ..... váha i-tého respondenta

$m$  ..... počet všech méně významných respondentů, kteří vykážali cenu ve sledovaném čtvrtletí

$v_v$  ..... je váhou stálou významného respondenta (použito u čtyř nejvýznamnějších sortimentů), stanovenou z jeho vlastních tržeb za rok 2010.

$v_0$  ..... je váhou, která se přepočítává každé čtvrtletí pro všechny méně významné respondenty, kteří vykážali cenu v daném čtvrtletí.  $v_0 = v_1 = \dots = v_m = 1,37$

**Vážený aritmetický průměr se používá pro výpočet průměrné ceny u čtyř významných sortimentů (III A/B smrk, IIIC.smrk, IIID. smrk, V. smrk).**

## b) Výpočet průměrné ceny prostým aritmetickým průměrem:

$$C_A = \frac{\sum C_i}{r} = \frac{1317 + 1261 + 1280 + \dots + 1251}{r} = 1276$$

$C_A$  ..... průměrná cena vypočtená prostým aritmetickým průměrem

$C_i$  ..... cena vykázaná i-tým respondentem

$r$  ..... počet všech respondentů, kteří vykážali cenu ve sledovaném čtvrtletí

Prostý aritmetický průměr se používá pro výpočet průměrné ceny u všech ostatních sortimentů (s výjimkou 4 významných sortimentů- viz výše)

## 1.2 Výpočet průměrných cen – nevlastníci:

Průměrné ceny u nevlastníků se počítají prostým aritmetickým průměrem.

## 2. Výpočet indexu cen surového dříví

a) Příklad výpočtu bazického indexu:

Sortiment dřeva		Průměrná cena bazická 1.Q 2011	Průměrná cena ve sledovaném čtvrtletí	Bazický index sledovaného čtvrtletí
Výřezy II. třídy jakosti	smrk	2795	2900	103,8
	borovice	2440	2475	101,4
	modřín	3734	3625	97,1
Výřezy III.A/B třídy jakosti	smrk	2048	2165	105,7
	borovice	1623	1686	103,9
	modřín	2002	2129	106,3

$I_b$

$$I_b = \frac{C_s}{C_b} = \frac{2900}{2795} = 103,8$$

$I_b$  ..... bazický index sledovaného čtvrtletí

$C_s$  ..... průměrná cena ve sledovaném čtvrtletí

$C_b$  ..... průměrná cena v základním období

b) Příklad výpočtu úhrnného bazického indexu:

Sortiment dřeva		kód váhy	Stálá váha 2009	kód indexu	Bazický index sledovaného čtvrtletí
<b>Úhrnem listnaté a jehličnaté</b>		<b>w</b>	<b>1000</b>	<b>I</b>	<b>102,3</b>
<b>celkem jehličnaté</b>		<b>w<sub>J</sub></b>	<b>908,16</b>	<b>I<sub>J</sub></b>	<b>102,0</b>
Výřezy II. třídy jakosti	smrk	w <sub>J1</sub>	3,58	I <sub>J1</sub>	103,8
	borovice	w <sub>J2</sub>	3,71	I <sub>J2</sub>	101,4
	modřín	w <sub>J3</sub>	3,64	I <sub>J3</sub>	97,1
Výřezy III.A/B třídy jakosti	smrk	⋮	413,79	⋮	105,7
	borovice	⋮	39,43	⋮	103,9
	modřín	⋮	12,10	⋮	106,3
Výřezy III.C třídy jakosti	smrk	⋮	142,02	⋮	101,7
	borovice	⋮	9,67	⋮	100,9
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Výřezy VI. řídy jakosti		w <sub>Js</sub>	⋮	I <sub>Js</sub>	⋮
<b>celkem listnaté</b>		<b>w<sub>L</sub></b>	<b>91,84</b>	<b>I<sub>L</sub></b>	<b>105,3</b>
Výřezy I. třídy jakosti	dub	w <sub>L1</sub>	2,32	I <sub>L1</sub>	115,7
Výřezy II. třídy jakosti	dub	w <sub>L2</sub>	3,21	I <sub>L2</sub>	94,5
	buk	w <sub>Li</sub>	0,38	I <sub>Li</sub>	114,5
Výřezy III. A/B třídy jakosti	dub	⋮	13,13	⋮	109,1
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	⋮	w <sub>Lt</sub>	⋮	I <sub>Lt</sub>	⋮

**Úhrnem listnaté a jehličnaté:**

$$I = \frac{I_J * w_J + I_L * w_L}{w} = \frac{102,0 * 908,16 + 105,3 * 91,84}{1000} = 102,3$$

$$w = w_J + w_L = 908,16 + 91,84 = 1000$$

Kde:

$$I_J = \frac{I_{J1}w_{J1} + I_{J2}w_{J2} + I_{J3}w_{J3} + \dots + I_{Js}w_{Js}}{w_J} \quad \dots \dots \dots \quad \text{celkem jehličnaté}$$

$$I_J = \frac{103,8 * 3,58 + 101,4 * 3,71 + 97,1 * 3,64 + \dots}{908,16} = 102,0$$

$$w_J = w_{J1} + w_{J2} + w_{J3} + \dots + w_{Js} = 3,58 + 3,71 + 3,64 + \dots = 908,16$$

Kde:

$$I_L = \frac{I_{L1}w_{L1} + I_{L2}w_{L2} + I_{L3}w_{L3} + \dots + I_{Lt}w_{Lt}}{w_L} \quad \dots \dots \dots \text{celkem listnaté}$$

$$I_L = \frac{115,7 * 2,32 + 94,5 * 3,21 + 114,5 * 0,38 + \dots}{91,84} = 105,3$$

$$w_L = w_{L1} + w_{L2} + w_{L3} + \dots + w_{Lt} = 2,32 + 3,21 + 0,38 + \dots = 91,84$$

V případě, že by u některého sortimentu chyběla průměrná cena, a tedy bazický index, pak se pro výpočet indexu "Celkem listnaté" nebo "Celkem jehličnaté" ve jmenovateli odečítá dílčí váha chybějícího sortimentu od celkové váhy za listnaté či jehličnaté, viz následující příklad:

Sortiment dřeva		Kód váhy	Stálá váha 2009	Kód indexu	Bazický index daného čtvrtletí
<b>Celkem listnaté</b>		<b>w<sub>L</sub></b>	<b>91,84</b>	<b>I<sub>L</sub></b>	<b>101,0</b>
Výřezy I. třídy jakosti	dub	w <sub>L1</sub>	2,32	I <sub>L1</sub>	
Výřezy II. třídy jakosti	dub	w <sub>L2</sub>	3,21	I <sub>L2</sub>	
	buk	w <sub>L3</sub>	0,38	I <sub>L3</sub>	104,8
Výřezy III. A/B třídy jakosti	dub	w <sub>Li</sub>	13,13	I <sub>Li</sub>	88,7
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

$$I_L = \frac{I_{L3}w_{L3} + I_{Li}w_{Li} + \dots}{w_L - w_{L1} - w_{L2}}$$

$$I_L = \frac{104,8 * 0,38 + 88,7 * 13,13 + \dots}{91,84 - 2,32 - 3,21} = 101,0$$

c) Příklad výpočtu Indexu předchozí období =100:

Sortiment dřeva		Bazický index předchozího čtvrtletí	Bazický index sledovaného čtvrtletí	Index předchozí období =100
Výřezy II. třídy jakosti	smrk	103,8	106,4	102,5
	borovice	101,4	92,5	91,2
	modřín	97,1	95,2	98,0
Výřezy III.A/B třídy jakosti	smrk	105,7	104,1	98,5
	borovice	103,9	100,4	96,6
	modřín	106,3	105,9	99,6

$I_p$

$$I_p = \frac{I_{bq}}{I_{b(q-1)}} = \frac{106,4}{103,8} * 100 = 102,5$$

$I_p$  ..... index k základu předchozí období=100

$I_{bq}$  ..... bazický index sledovaného čtvrtletí

$I_{b(q-1)}$  ..... bazický index předchozího čtvrtletí

d) Příklad výpočtu Indexu stejné období předchozího roku = 100:

Sortiment dřeva		Bazický index sledovaného čtvrtletí v předchozím roce	Bazický index sledovaného čtvrtletí	Index stejné období předchozího roku =100
Výřezy II. třídy jakosti	smrk	103,8	104,1	100,3
	borovice	101,4	98,4	97,0
	modřín	97,1	97,6	100,5
Výřezy III.A/B třídy jakosti	smrk	105,7	105,1	99,4
	borovice	103,9	99,3	95,6
	modřín	106,3	104,9	98,7

$I_s$

$$I_s = \frac{I_{br}}{I_{b(r-1)}} = \frac{104,1}{103,8} * 100 = 100,3$$

$I_s$  ..... index k základu stejné období předchozího roku=100

$I_{br}$  ..... bazický index sledovaného čtvrtletí

$I_{b(r-1)}$  ..... bazický index sledovaného čtvrtletí v předchozím roce